



تست اسکاج برای بررسی وجود تخم نوعی از انگل های کرمی از جمله کرمک یا اکسیور درخواست می شود.

کرمک در مدفوع وجود دارد و برای تخم ریزی به ناحیه مقعد می رود و در آنجا تخم ریزی می کند. این کرم معمولاً شبها حرکت می کند و باعث تحریک و خارش در ناحیه مقعد می شود و باعث عصبی شدن فرد می شود.

از آنجا که این کرم بیشتر در کودکان دیده می شود باعث بروز دندان قروچه در آنها می شود.

تخم ریزی کرم در صبح و در ناحیه مقعد می باشد و معمولاً تخم در ناحیه چین های مقعد باقی می ماند و باعث اذیت شدن آنها می شود. یز شک با مشاهده علائم و خارش در خواست تست اسکاج را می هد که باید از ناحیه مقعد نمونه گیری شود و معمولاً از والدین درخواست می شود تا نمونه گیری کنند. البته نمونه گیری باید دقیق و صحیح باشد تا تشخیص صحیح صورت گیرد.

برای نمونه گیری تست اسکاج باید به نکات زیر توجه بفرمایید:

- یک عدد لام شیشه ای تمیز دارای برچسب مشخصات از بخش نمونه گیری تحویل بگیرید.
- این آزمایش با هدف تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی (کرمک) به وسیله مشاهده تخم آن در زیر میکرو سکوپ صورت می گیرد و با توجه به اینکه این کرم شب هنگام در نواحی اطراف مقعد تخم ریزی می کند نمونه گیری را صبح و قبل از رفتن به توالت یا حمام کردن انجام دهید.
- دست های خود را قبل و بعد از نمونه گیری با آب و صابون بشوئید. حین نمونه گیری دستکش بپوشید.
- یک قطعه نوار چسب اسکاج به طول ۱۰ سانتی متر بریده و دو طرف آن را با انگشتان خود بگیرید.
- بهتر است بیمار به حالت سجده خوابانده شود و کمی فشار داخل شکم خود را افزایش دهد تا مخاط مقعد نمایان شود. سپس چسب را بطور کامل بر روی چین های مخاطی اطراف مقعد چسبانده و جدا کنید.
- عمل فوق را مکرراً در دور تا دور چین مخاطی مقعد انجام دهید.
- در آخر چسب را بر روی لام شیشه ای چسبانده و به آزمایشگاه تحویل دهید.
- اگر از داروی خاصی استفاده می کنید آزمایشگاه را مطلع سازید.